N° Réf :.....

Centre Universitaire
Abd elhafid boussouf Mila

Institut des sciences et de la technologie

Département de Mathématiques et Informatique

Mémoire préparé en vue de l'obtention du diplôme de licence
En : Filière mathématiques

Le système linéaire $AX=B$ et ses applications

Préparé par :

Encadrer par :

- BOUNAMOUS KHADIDJA
- BOUREDROUDA AMINA
- BOUZERAA HAKIMA
- DIAF HESNA

Mr. BOUFELGHA IBRAHIM

Année universitaire : 2014/2015

REMERCIEMENTS

Au nom du Dieu le miséricordieux par essence et par excellence...

*Nous adressons notre profond remerciement tout d'abord
notre encadreur*

Mr. BOUFELGHA IBRAHIM

*Pour sa patience, et surtout pour sa confiance, ses
remarques et ses conseils, sa disponibilité et sa bienveillance.*

*Nous voudrions également remercier tout le personnel de
l'institut de sciences et de la technologie.*

*Enfin, nous remercions toutes personnes qu'ont contribué de
prés ou de loıs à l'achèvement de ce travail surtout notre
amis : SANA, BOUCHRA, DJAHIDA, IMEN, FOUZIA,
AMINA, NASSIMA...*

*Sans oublier nos frères de la classe de Génie Mécanique
chaqu'un son nom.*

MERCI POUR TOUT

Dédicace

Avant tout, je remercie mon **DIEU** qui, grâce à sa miséricorde ma bénédiction dans ma vie...

Je tiens à Didier ce travail..

A mon père **AHMED**, qui je vois un père qui a consacré sa vie à sa famille, et vous êtes à côté de moi en toutes circonstances me rappelle à plusieurs la responsabilité...merci papa

A ma mère **FATIHA**, qui je vois la maman parfaite, toujours prête à se sacrifier pour le bonheur de ses enfants...merci maman

A mon cher frère **MOHAMMED** qui m'a toujours supporté dans mes décisions, je t'aime...merci moha

Sans oublier mon géminé **KHIR EL DINNE**... je t'aime.

A mes chères sœurs : **SABRINA** (et son enfant : **ZINO (ZIN ELDINNE)**), la princesse **MARWA** et ma petite fifi **AMIRA**), **NERDJES** (et son enfant : la acrimonieuse **RIMAS** et le petit ange **NIHALE**), **MERIEM** et **MADIHA**...qui je le sais ma réussite est très importante pour vous, que dieu paye pour tous vos bienfaits.

A tous oncles, cousins, cousines, tantes et toute famille de **BOUNAMOUS** et **CHABBEH**

A amis de malheur avant la joie : **HAKIMA**, **MONI (AMINA)**, **HESNA** et **SOUMIA**...

MERCI A TOUS ET JE VOUS AIME BEAUCOUP

BOUNAMOUS KHADIDJA

Dédicace

Je remercie dieu tout puissant de m'avoir aidé, et
Éclairer le chemin pour Achever mon travail et mes études.

A mon père **MAHMOUDE** qui a souhaité vivre pour
longtemps juste pour nous voir qu'est -ce que nous allons
devenir.

A celle qui m'a transmis la vie, l'amour, le courage, à toi
Cher maman **SAKINA** toutes mes joies, mon amour et ma
reconnaissance.

Je remercie mes sœurs, **HANANE** (et son enfants
NOUHA, **ANESSE** et **MAISSE**), **SOUMIA**, **AMEL**,
MERIEM, **CHAHARA ZAD**, surtout mon cher frère
SOUFIEN que j'aime beaucoup, et tout famille de
BOUREDROUDA LAKHDAR.

A mes cherres amées, **HASNA**, **HAKIMA**, **KHADIDJA** et
WAHIBA.

MERCI A TOUS

BOUREDROUDA AMINA

Dédicace

Au nom d'**Allah** le plus grand merci lui revient de nous avoir guidé vers le droit chemin, de nous avoir Aidées tout au long de nos années de l'étude.

A la plus belle créature que dieu a créée sur terre...

A cette source de tendresse, de patience et de générosité...

A ma mère **OUM ELSSAAD**

A qui toujours était à mes cotés

A mon père **TOUFIK**

A mes chères frères : **SABER** et **NEWWR**

A mes chères sœurs : **BESMA** et **SAMIA**

A mes grandes mères, mon grand père, mes oncles, cousins, cousines et tantes.

A tous mes amis : **KHADIDJA**, **AMINA**, **HASNA**, **MANEAU**, **AMINA RAHALE**...

A tous famille de **BOUZERAA** et **BOUCENNA**

MERCI A TOUS

BOUZERAA **HAKIMA**

Dédicace

Je dédie ce modeste travail

A celle à qui mon cœur depuis sa naissance n'a pas pu éprouver qu'amour et reconnaissance à celle qui a donné un sens à mon existence en m'offrant une éducation digne de confiance...

*A Ma Chère Mère **FARIDA***

A mon père, pour son amour et son soutien moral depuis mon enfance...

*A Mon père **TAHAR**, merci*

*A tous les membres de ma famille : Mes frères (**YOUSSEF, WALID, OUSSAMA**), Ma sœur (**MERIEM**)*

*A tous mes cousins et a toutes familles de **DIAF** et **AMIOUR**, et a mes meilleurs amis : **AMINA, KHADIDJA, HAKIMA**...*

MERCI A TOUS

DIAF

HESNA

Table des matières

Introduction Générale	2
1 Terminologies et notations :	5
1.1 L'analyse numérique	5
1.2 Les matrices	5
1.2.1 Le rang d'une matrice	7
1.2.2 Opérations sur les matrices	7
1.2.3 La trace d'une matrice	8
1.2.4 La transposé d'une matrice	9
1.2.5 Déterminant d'une matrice	9
1.2.6 L'inverse d'une matrice carrée	10
1.3 Les équations	11
1.3.1 Equation linéaire à deux inconnues :	11
1.3.2 Résolution du problèmes du premier degré (problème se ramenant à une équation)	12
1.3.3 Résolution des problèmes du second degré	13
1.3.4 Equation générale de degré n	14
1.4 Espace vectoriel	14
2 Résolution d'un système linéaire $AX=B$	16
2.1 Le système d'équations linéaires	16
2.1.1 Les différentes formes du système linéaire	16
2.1.2 Les solutions possibles d'un système	17
2.2 Les méthodes de résolution d'un système linéaire $AX = B$	19
2.2.1 Les méthodes classiques	19
2.2.2 Les méthodes numériques	19
2.2.3 Méthodes directes	20
2.2.4 Méthodes itératives	38

2.2.5	Comparaison entre les méthodes :	45
3	L'utilisation de l'outil informatique pour la résolution un système linéaire $AX=B$	47
3.1	Introduction sur MATLAB	47
3.2	Matrice et vecteur dans MATLAB	47
3.3	Equations et systèmes linéaires dans MATLAB	50
3.4	Méthode directe (Méthode du pivot)	51
3.5	Méthodes itératives	53
3.5.1	Méthode de Gauss-Seidel	53
	Conclusion Générale	56
	Bibliographie	56

Introduction Générale

Le développement des mathématiques en générale, et de l'analyse numérique en particulier, a été et sera toujours nécessaire pour la résolution des problèmes de plus en plus complexes posés par la physique et les sciences de l'ingénieur. certaines méthodes numériques, pour la résolution de problèmes mathématiques, sont déjà devenues classiques, et le développement de logiciels de calcul numérique, de plus en plus précis, pourraient amener certains utilisateurs à se poser la question " pourquoi étudier ces méthodes ?" la réponse à cette question est toute simple, l'utilisation optimale de toute technique ou procédé, ou leur amélioration, ne peut se faire sans la maîtrise de ses outils de base .

Comme l'algèbre linéaire qui est un outil essentiel pour toutes les branches des mathématiques appliquées, en particulier lorsqu'il s'agit de modéliser puis résoudre numériquement des problèmes issus de divers domaines, des sciences physiques ou mécaniques, des sciences du vivant, de la chimie, de l'économie, des sciences de l'ingénieur,.....

Par exemple, la physique aborde des relations linéaires, les lois fondamentales du mouvement sont presque toutes linéaires, ou se déduisent de lois linéaires. les systèmes électriques sont fondamentalement décrits par des lois linéaires ($V = RI$, etc.) c'est pourquoi, on commence par une étude des équations linéaires.

La résolution d'un système linéaire algébrique est au coeur de la plupart des calculs en analyse numérique . Il paraît donc naturel de débiter un cours de calcul scientifique par là.

Dans notre travail, nous nous intéressons aussi aux algorithmes de résolution de ces systèmes linéaires. Pour cela, nous considérons le problème suivant :

Trouver le vecteur solution X , telle que :

$$AX = B$$

Où A est une matrice carrée et B un vecteur donné à coefficients réels ou complexe. La discretisation d'équation différentielle ordinaire ou d'équation aux dérivées partielles, la modélisation de problème en physique, chimie ou économie conduit à la résolution du système linéaire de grande taille avec plusieurs milliers d'inconnues et il devient particulièrement impossible de résoudre ces systèmes d'équations sans l'aide d'un ordinateur. Il s'agit alors de trouver des algorithmes de résolution efficace où le nombre d'opérations et donc le temps de calcul, n'est pas prohibitif, c'est un problème classique mais difficile en analyse numérique.

Dans ce mémoire, nous étudions les systèmes linéaires. Pour cela, on commence par la description de ce système, ensuite nous nous intéressons aux méthodes de résolution de ces systèmes et nous finissons par l'application de ces systèmes et l'intérêt de l'utilisation de l'outil informatique.

Notre mémoire, se décompose en trois chapitres, Dans le premier chapitre, nous pré-

sentons les terminologies, notations, les définitions et différentes notions qui seront utiles pour l'élaboration du mémoire, le deuxième chapitre sera consacré pour la position du problème et nous présentons quelques méthodes de résolution et comparaison entre les différentes méthodes.

Dans le troisième chapitre, on s'intéresse à l'utilisation de l'outil informatique pour la résolution d'un système linéaire $AX=B$.

Chapitre 1

Terminologies et notations :

1.1 L'analyse numérique

L'**analyse numérique** est une discipline des mathématiques. Elle s'intéresse tant aux fondements théoriques qu'à la mise en pratique des méthodes permettant de résoudre, par des calculs purement numériques, des problèmes d'analyse mathématique.

Plus formellement, l'**analyse numérique** est l'étude des algorithmes permettant de résoudre les problèmes de mathématiques continues (distinguées des mathématiques discrètes). Cela signifie qu'elle s'occupe principalement de répondre numériquement à des questions à variable réelle ou complexe comme l'algèbre linéaire numérique sur les champs réels ou complexes, la recherche de solution numérique des équations différentielles et d'autres problèmes liés survenant dans les sciences physique et l'ingénierie.

1.2 Les matrices

Définition 1.2.1 Nous appelons matrice de type (m, n) (ou à m lignes et n colonnes) sur $\mathbb{R}$, une famille doublement indexée d'éléments de $\mathbb{R}$.

(a_{ij}) , ($i = \overline{1, m}$ et $j = \overline{1, n}$) habituellement représentée sous la forme :

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

les a_{ij} sont appelés les éléments ou termes ou coefficients de la matrice.

Une matrice de type $(1, n)$ est appelée vecteur ligne (de dimension n) et une matrice de type $(m, 1)$ est appelée vecteur colonne (de dimension m).

Définition 1.2.2 Soit $M \subset M_{m,n}(\mathbb{R})$

1. Si $m = n$, M est dite matrice **carrée**

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 14 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Si $m = 1$, M est dite matrice **ligne**

$$(1, 2); \quad (3, 5, 0, -6)$$

3. Si $n = 1$, M est dite matrice **colonne**

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 9 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 16 \\ 0 \\ -5 \end{pmatrix}$$

4. Si $m = n$ et $a_{ij} = 0$ pour $i \neq j$, M dite matrice **diagonale**

$$\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & -11 \end{pmatrix}$$

5. Si M est une matrice diagonale et $a_{ij} = 1$ pour $i = j$; M est dite **la matrice identité** et note I_n

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad I_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

6. Si $m = n$ et $a_{ij} = 0$ pour $m < n$, M est dite matrice **triangulaire supérieur**

$$\begin{pmatrix} 3 & 8 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

7. Si $m = n$ et $a_{ij} = 0$ pour $m > n$, M est dite matrice **triangulaire inférieure**

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -1 & 6 & 0 \\ 3 & 9 & 7 \end{pmatrix}$$

1.2.1 Le rang d'une matrice

Définition 1.2.3 Soit $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$

On appelle **rang de la matrice** A , et on note rgA , la taille maximale d'une matrice carrée inversible.

Exemple 1.2.4 on a

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

La matrice A étant de taille 3×4 , son rang sera inférieur ou égal à 3.

La matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ extraite de A ayant un déterminant non nul, elle est inversible :

$$rg = 3$$

1.2.2 Opérations sur les matrices

La somme :

Soient $A, B \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, la somme de A et B est une matrice apparaissant en $M_{m,n}$ telle que :

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

Exemple 1.2.5 on a

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -5 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 3 \\ 4 & 6 & 7 \end{pmatrix}; \quad C = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$A + B = \begin{pmatrix} 11 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -2 \\ 7 & 10 & 8 \end{pmatrix}$; mais $A + C$ impossible (les matrices A et C n'ont pas les même dimensions)

Le produit d'une matrice par un scalaire

Définition 1.2.6 soit $M \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, on appelle le produit de M par λ est une matrice $B \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ telle que : $b_{ij} = \lambda a_{ij}$

Exemple 1.2.7 on a

$$\lambda = 2; M = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 3 & -4 \end{pmatrix}$$

$$\lambda M = 2 \begin{pmatrix} 2 & 6 & -2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 3 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 12 & -4 \\ 2 & 6 & 0 \\ 2 & 6 & -8 \end{pmatrix}$$

Le produit de deux matrices

Définition 1.2.8 : soient $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ et $B \in M_{n,p}(\mathbb{R})$, on appelle produit de A et B

la matrice $C \in M_{m,p}(\mathbb{R})$ telle que :

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \quad ; \text{ remarque : } (m,n) \times (n,p) = (m,p)$$

Exemple 1.2.9 on a

$$A = \begin{pmatrix} \text{le} & a & \text{le} \\ \text{un} & a & \text{un} \\ \text{le} & \text{avait} & \text{un} \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} \text{chat} & \text{rat} & \text{lion} \\ \text{mangé} & \text{dévoré} & \text{dégusté} \\ \text{pain} & \text{lait} & \text{chat} \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} \text{le chat a mangé le pain} & \text{le rat a dévoré le lait} & \text{le lion a dégusté le chat} \\ \text{un chat a mangé un pain} & \text{un rat a dévoré un lait} & \text{un lion a dégusté un chat} \\ \text{le chat avait mangé un pain} & \text{le rat avait dévoré un lait} & \text{le lion avait dégusté un chat} \end{pmatrix}$$

1.2.3 La trace d'une matrice

Définition 1.2.10 Soit $M \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ on appelle la trace de M et on note :

$$\text{tr}(M) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

Exemple 1.2.11 on a : $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$;

$$\text{tr}(A) = 2 + (-4) = -2$$

1.2.4 La transposé d'une matrice

Définition 1.2.12 Soit $M \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ on appelle transposé de M_{ij} et on note tM la matrice définie par : ${}^tM = (M_{ji})$; où $M \in M_{m,n}(\mathbb{R})$.

on a :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 11 & -6 & 0 \\ 0 & -2 & 8 \end{pmatrix}$$

donc :

$${}^tM = \begin{pmatrix} 1 & 11 & 0 \\ 2 & -6 & -2 \\ 3 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

1.2.5 Déterminant d'une matrice

Définition 1.2.13 étant donné $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, on appelle **déterminant** de la matrice $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m}$ le nombre, noté $\det A$, qui peut être calculé, par récurrence, de la façon suivante :

1. par un développement suivant la ligne i , $i \in \{\overline{1, n}\}$:

$$\det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \Delta_{ij}(A)$$

2. par un développement suivant la colonne j , $j \in \{\overline{1, n}\}$:

$$\det A = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \Delta_{ij}(A)$$

où pour tout couple d'indices $(i, j) \in \{\overline{1, n}\}^2$, appelé **mineur d'indice** (i, j) , est le déterminant de la matrice obtenue en enlevant à A la ligne i et la colonne j . quel que soit le mode de calcul retenu, on obtient, bien sûr, le même résultat.

Exemple 1.2.14 on a

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & 6 & -3 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\det A = 1((6 \times 5) - 2(-3)) + (1(3(-3) - 6(-2))) = 39$$

1.2.6 L'inverse d'une matrice carrée

Définition 1.2.15 On dit que $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ est inversible s'il existe une matrice $B \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ telle que :

$$A \cdot B = B \cdot A = I_n \text{ est dit l'inverse de } A \text{ et noté } A^{-1}.$$

Exemple 1.2.16 on a

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = B \cdot A, \text{ donc } B \text{ est l'inverse de } A.$$

Proposition 1.2.17 1. soit $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ est inversible $\iff \det A \neq 0$

2. soit $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ si $\det A \neq 0$ alors : $A^{-1} = \frac{1}{(\det A)} {}^t(\text{com}A)$ telle que

$$\text{com}A = \begin{pmatrix} \Delta_{11} & \Delta_{12} & \Delta_{13} \\ \Delta_{21} & \Delta_{22} & \Delta_{23} \\ \Delta_{31} & \Delta_{32} & \Delta_{33} \end{pmatrix} \quad \text{où} \quad \Delta_{ij} = (-1)^{i+j} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{mn} \end{vmatrix}$$

Exemple 1.2.18 on a :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & 6 & -3 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\det A = 39, \quad \text{com}A = \begin{pmatrix} 36 & -3 & -6 \\ -19 & 7 & 1 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix}, \quad {}^t(\text{com}A) = \begin{pmatrix} 36 & -19 & 3 \\ -3 & 7 & 3 \\ -6 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\text{donc } A^{-1} = \frac{1}{39} \begin{pmatrix} 36 & -19 & 3 \\ -3 & 7 & 3 \\ -6 & 1 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{12}{13} & \frac{-19}{39} & \frac{1}{13} \\ \frac{-1}{13} & \frac{7}{39} & \frac{1}{13} \\ \frac{-2}{13} & \frac{1}{39} & \frac{2}{13} \end{pmatrix}$$

1.3 Les équations

Définition 1.3.1 De manière générale, on appelle équation linéaire dans les variables $x_1, \dots, x_n$ toute relation de la forme :

$$a_1x_1 + \dots + a_nx_n = b \quad (1.1)$$

où $a_1, \dots, a_n$ et b sont des nombres réels.

Il est important d'insister ici que ces équations sont implicites, c'est-à-dire qu'elles décrivent des relations entre les variables, mais ne donnent pas directement les valeurs que peuvent prendre les variables.

Résoudre une équation signifie donc la rendre explicite, c'est-à-dire rendre plus des rentes les valeurs que les variables peuvent prendre.

Une solution de l'équation linéaire (1.1) est un n -uplet $s_1, \dots, s_n$ de valeurs des variables $x_1, \dots, x_n$ qui satisfont à l'équation (1.1). Autrement dit

$$a_1s_1 + \dots + a_ns_n = b$$

1.3.1 Equation linéaire à deux inconnues :

L'équation de la forme $ax + by + c$, avec $a, b, c \in \mathbb{R}$ est une équation linéaire à deux inconnues.

L'ensemble des solutions d'une telle équation à deux inconnues réelles est une partie de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, c'est-à-dire un ensemble de nombres réels. Le graphique de cet ensemble est donc une partie du plan cartésien.

Rechercher des solutions d'une équation linéaire à deux inconnues

Exemple 1.3.2 Soit à résoudre l'équation linéaire $2x - 3y + 6 = 0$.

1. Donnons à x une valeur quelconque : 5.

2. On obtient alors $y = \frac{16}{3}$.

Le couple de réels $(5; \frac{16}{3})$ est une solution de l'équation

3. Donnons à y une valeur quelconque : -2

On obtient alors $x = -6$

Le couple de réels $(-6; -2)$ est une solution de l'équation.

4. Il apparaît ainsi que l'ensemble des solutions de cette équation est infini.

1.3.2 Résolution des problèmes du premier degré (problème se ramenant à une équation)

Les équations de premier degré sont celles qui peuvent se mettre sous la forme

$$ax + b = 0.$$

Il y a une unique solution (si $b \neq 0$) qui est $x = \frac{-b}{a}$.

La résolution d'un problème du premier degré se fait en cinq étapes :

1. Choix de l'inconnue.
2. Mise en équation ou inéquation du problème.
3. Résolution de l'équation ou de l'inéquation.
4. Vérification du résultat.
5. Interprétation du résultat et conclusion.

Exemple 1.3.3 Une mère de quarante cinq ans a une fille de 13 ans.

Dans combien d'année l'âge de la fille sera la moitié de l'âge de sa mère ?

Choix de l'inconnue :

On commence par nommer l'inconnue que l'on cherche :
soit x le nombre d'années cherché

Mise en équation du problème :

L'âge de la mère après ces x années sera de $45+x$

L'âge de la fille après ces x années sera de $13+x$

et l'âge de la fille sera la moitié de celui de sa mère on a donc :

$$13 + x = \frac{45 + x}{2}$$

$$2 \times (13 + x) = 45 + x$$

$$26 + 2x = 45 + x$$

$$2x - x = 45 - 26$$

$$x = 19$$

Vérification du résultat :

$$x = 19$$

Dans 19 ans

$$13 + 19 = 32$$

L'âge de la fille sera de 64 ans,

$$45 + 19 = 64$$

L'âge de la mère sera de 64 ans

L'âge de la fille sera bien moitié de L'âge de la mère.

Conclusion 1.3.4 *interprétation du résultat :*

Dans 19 ans L'âge de la fille sera moitié de celui de sa mère.

1.3.3 Résolution des problèmes du second degré

Les équations du second degré sont des équations qui s'écrivent sous la forme :

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (\text{avec } a \text{ non nul})$$

Pour pouvoir résoudre une telle équation il faut tout d'abord calculer le **discriminant** Δ .

Il suffit d'appliquer cette formule :

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

On le calcule, ensuite selon le résultat on peut savoir le nombre de solutions qu'il y a, et les trouver s'il y en a :

1. Si $\Delta < 0$, rien de plus simple : il n'y a pas de solution.
2. Si $\Delta = 0$, il y a une seule solution à l'équation c'est :

$$x = \frac{-b}{2a}$$

3. Si $\Delta > 0$, il y a deux solutions qui sont :

$$\begin{cases} x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \\ \text{et} \\ x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \end{cases}$$

1.3.4 Equation générale de degré n

Définition 1.3.5 On dira que les éléments $b_1, \dots, b_s$ sont **algébriquement indépendants** sur $\mathbb{k}$ si, et seulement si, ces éléments ne satisfont aucune relation de la forme :

$$\sum \alpha_{i_1 i_2 \dots i_s} b_1^{i_1} \dots b_s^{i_s} = 0$$

à coefficients non nuls.

Autrement dit, $b_1, \dots, b_s$ sont algébriquement indépendants si, et seulement si, ils n'annulent aucun polynôme non nul $P(X_1, \dots, X_s) \in \mathbb{R}[X_1, \dots, X_s]$ à n indéterminées.

Exemple 1.3.6 Si a est transcendant sur $\mathbb{R}$ et b est transcendant sur $\mathbb{R}(a)$, alors a, b sont algébriquement indépendants sur $\mathbb{k}$, car si nous avons :

$$\sum_{i,j} \alpha_{i,j} a^i b^j = 0$$

alors

$$\sum_j \left(\sum_i \alpha_{i,j} a^i \right) b^j = 0$$

Mais b est transcendant sur $\mathbb{R}(a)$. d'où

$$\sum_i \alpha_{i,j} a^i = 0 \quad \text{pour tout } j$$

a est aussi transcendant sur $\mathbb{R}$. Les relations précédentes impliquent $\alpha_{i,j} = 0$ pour tout i et tout j ce qui prouve l'indépendance algébrique de a et b sur $\mathbb{R}$.

1.4 Espace vectoriel

En mathématiques, plus précisément en algèbre linéaire et en algèbre générale, un espace vectoriel est un ensemble muni d'une structure permettant d'effectuer des combinaisons linéaires.

Etant donné un corps $\mathbb{k}$, un espace vectoriel E sur $\mathbb{k}$ est un groupe commutatif (dont la loi est notée $+$) muni d'une action «compatible» de $\mathbb{k}$. Les éléments de E sont appelés des vecteurs, et les éléments de $\mathbb{k}$ des scalaires.

Définition 1.4.1 Soit $\mathbb{k}$ un corps, un espace vectoriel sur $\mathbb{k}$, ou $\mathbb{k}$ -espace vectoriel, est un ensemble E , dont les éléments sont appelés vecteurs, muni de deux loi :

- une **loi de composition interne** « $+$ » : $E^2 \longrightarrow E$, appelée **addition** ou **somme vectoriel**.

- une **loi de composition externe** à gauche « $\cdot$ » : $\mathbb{k} \times E \longrightarrow E$, appelée **multiplication par un scalaire**.

telles que les propriétés suivantes soient vérifiées.

1. $(E, +)$ est un **groupe abélien**, autrement dit :

- la loi « $+$ » est **commutative** et **associative**,
- elle admet un **élément neutre**, pouvant être noté 0 ou 0_E , appelé **vecteur nul**

et tout vecteur v a un **opposé**. noté $-v$.

2. La loi « $\cdot$ » vérifie les propriétés suivantes :

- elle est **distributive** à gauche par rapport à la loi « $+$ » de E et à droite par rapport à l'addition du corps $\mathbb{k}$.

- elle vérifie une **associativité mixte** (par rapport à la multiplication dans $\mathbb{k}$).
- l'**élément neutre multiplicatif** du corps $\mathbb{k}$, noté 1 , est neutre à gauche pour $(\cdot)$.

Exemple 1.4.2 Soit V l'ensemble des matrices de taille $n \times m$, muni de l'addition des matrices et produit d'un vecteur par un scalaire est un espace vectoriel.

Chapitre 2

Résolution d'un système linéaire $AX=B$

2.1 Le système d'équations linéaires

On appelle système linéaire d'ordre n (n entier positif), une expression de la forme

$$AX = B$$

où A est une matrice de coefficients (a_{ij}) $1 \leq i, j \leq n$, désigne une matrice de taille $n \times n$ de nombre réels ou complexes, B est vecteur colonne réel ou complexe obtenent les éléments (b_i) , $1 \leq i \leq n$, et $X=(x_i)$, $1 \leq i \leq n$, est vecteur des inconnues du système. La relation précédente équivant aux équations

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i, \quad i=\overline{1, n}$$

la matrice A est dite régulière (ou non singulière) si $\det A \neq 0$, on a existence et unicité de la solution X (pour n'importe quel vecteur B donné) si et seulement si la matrice associée au système linéaire est régulière.

2.1.1 Les différentes formes du système linéaire

Forme fonctionnelle (général)

En général, un système de m équations linéaires à n inconnues peut être écrit sous la forme suivantes :

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

où $x_1, x_2, \dots, x_n$ sont les inconnues.

Forme matricielle

Un système linéaire peut être aussi écrit sous la forme matricielle :

$$AX = B$$

où A est une matrice de taille $m \times n$, X est un vecteur de taille n .

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} + a_{12} + \dots + a_{1n} \\ a_{21} + a_{22} + \dots + a_{2n} \\ \vdots \\ a_{n1} + a_{n2} + \dots + a_{nn} \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

2.1.2 Les solutions possibles d'un système

Cas général

Si A est une **matrice carré inversible** d'ordre n , alors le système d'équation dont l'écriture matricielle est $AX = B$ admet une **unique solution** : $X = A^{-1}B$.

Exemple 2.1.1 le système $\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ x - y = -1 \end{cases}$ a pour écriture matricielle $AX = B$ avec $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 8 \\ -1 \end{pmatrix}$. le déterminant de A est non nul, A est donc inversible.

A l'aide d'une calculatrice, on obtient $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.6 \\ 0.2 & -0.4 \end{pmatrix}$. Il y a donc une unique solution $X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Cas particuliers

Si A est une **matrice carré inversible** d'ordre n , alors le système d'équation dont l'écriture matricielle est $AX = B$ admet une **unique solution** : $X = A^{-1}B$.

Exemple 2.1.2 : le système $\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ x - y = -1 \end{cases}$ a pour écriture matricielle $AX = B$ avec $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 8 \\ -1 \end{pmatrix}$. le déterminant de A est non nul, A est donc inversible.

A l'aide d'une calculatrice, on obtient $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.6 \\ 0.2 & -0.4 \end{pmatrix}$. Il y a donc une unique solution $X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Cas particuliers

Si la matrice A n'est pas inversible, le système admet soit **infinité de solution**, soit **aucune solution**.

Exemple 2.1.3 $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x + 2y = 10 \end{cases}$ a pour écriture matricielle $AX = B$ avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \end{pmatrix}$.

Le déterminant de A est nul donc A n'est pas inversible.

Exemple 2.1.4 On constate que la ligne 2 du système vaut 2 fois la première ligne, il y a donc une infinité des solutions.

Exemple 2.1.5 $\begin{cases} x - y = 1 \\ 2x - 2y = 5 \end{cases}$ a pour écriture matricielle $AX = B$ avec $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}$. Le déterminant de A est nul donc A n'est pas inversible.

Ici, la première et la seconde ligne du système ne sont pas proportionnelles, il n'y a donc pas des solutions.

2.2 Les méthodes de résolution d'un système linéaire

$$AX = B$$

En général, il y a deux méthodes qui permettant de résoudre le système linéaire $AX = B$.

2.2.1 Les méthodes classiques

Les méthodes classiques (Cramer) deviennent très lentes en temps d'exécution (de calcul) dès que n dépasse 4.

Théorème 2.2.1 (Cramer)

Soit $A = (a_{ij})_{i,j}$ une matrice carré d'ordre n et $b = (b_i)$, $i = \overline{1, n}$, un vecteur colonne. Si $\det(A) \neq 0$. alors le système :

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i, \quad i = \overline{1, n} \quad (\text{ou encore } AX=B)$$

admet l'unique solution $x = (x_i)$, $i = \overline{1, n}$ telle que :

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}, \quad i = \overline{1, n}$$

où A_i est la matrice obtenue en remplaçant dans A la i^{eme} colonne par la colonne B .

Numériquement : on calcule :

1. $\det(A)$
2. $\det(A_i)$, $i = \overline{1, n}$
3. $\frac{\det(A_i)}{\det(A)}$, $i = \overline{1, n}$

Pour $n = 10$, la méthode de Cramer exige $3 \cdot 10^9$ opérations.

2.2.2 Les méthodes numériques

Les méthodes numériques ayant des temps de calcul acceptables et de nombre d'opérations de l'ordre de n^3 pour un système $AX = B$ où A est une matrice carré d'ordre n .

Ces méthodes peuvent être **directes** ou **indirectes (itératives)**

1. Les méthodes directes :

Définition 2.2.2 Une méthode est dite **directe**, si elle donne au bout d'un nombre **fini** d'opération une solution **exacte** du problème

Remarque 2.2.3 utilisées généralement lorsque $n \leq 100$, et si A est une matrice pleine (pas beaucoup zéros).

Les méthodes directes sont :

1. Méthode de Gauss (méthodes du pivot)
2. Méthode de Gauss-Jordan
3. Méthode de décomposition de A en $L.U$
4. Méthode de Cholesky

1. Les méthodes itératives (indirectes) :

Définition 2.2.4 une méthode **itérative** de résolution du système $AX = B$ consiste d'abord à passer au système $X = \alpha X + \beta$ (que l'on déterminera) et sa solution est alors la limite de la suite définie par : $x_{k+1} = \alpha x_k + \beta$, x_0 étant une approximation initiale.

Remarque 2.2.5 utilisées généralement lorsque $n \geq 100$, et si A est une matrice contient beaucoup d'éléments nuls

Les méthodes indirectes sont :

1. Méthode de Jacobi
2. Méthode de Gauss-Seidel

2.2.3 Méthodes directes

Méthode de Gauss :

Soit $AX = B$ où A est une matrice ($n \times n$), régulière.

Principe : Transformation de la matrice A en une matrice triangulaire supérieure.

Pour cela on construit $[A:B]$ et :

$[A:B] \xrightarrow{\text{transformation}} [A':B']$ où A' est une matrice triangulaire supérieure.

$$ie : \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & b_n \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} a'_{11} & a'_{12} & \dots & a'_{1n} & b'_1 \\ 0 & a'_{22} & \dots & a'_{2n} & b'_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a'_{nn} & b'_n \end{pmatrix}$$

$$\left[A : B \right] \rightarrow \left[A' : B' \right]$$

* Puis, résoud le système $A'X = B'$ (dont la solution est exactement la solution du système $AX = B$)

ETAPES : On pose $A = A^{(1)}$ et $B = B^{(1)}$

1^{ere} étape :

* Si $a_{11}^{(1)} \neq 0$, on fait les affectations suivantes

- La ligne L_1 est maintenue ie : $L_1^{(2)} \leftarrow L_1^{(1)}$
- Pour $i = 2, \dots, n$: $L_i^{(2)} \leftarrow L_i^{(1)} - \frac{a_{i1}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}} \cdot L_1^{(1)}$

On obtient alors :

$$\begin{pmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \dots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ a_{21}^{(1)} & a_{22}^{(1)} & \dots & a_{2n}^{(1)} & b_2^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1}^{(1)} & a_{n2}^{(1)} & \dots & a_{nn}^{(1)} & b_n^{(1)} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} a_{11}^{(2)} & a_{12}^{(2)} & \dots & a_{1n}^{(2)} & b_1^{(2)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & \dots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n2}^{(2)} & \dots & a_{nn}^{(2)} & b_n^{(2)} \end{pmatrix}$$

$$\left[A^{(1)} : B^{(1)} \right] \rightarrow \left[A^{(2)} : B^{(2)} \right]$$

où :

$$\begin{cases} a_{1j}^{(2)} = a_{1j}^{(1)} & j = \overline{1, n} \\ a_{ij}^{(2)} = a_{ij}^{(1)} - \frac{a_{i1}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}} \cdot a_{1j}^{(1)}, & i = \overline{2, n}; j = \overline{1, n} \end{cases}$$

et

$$\begin{cases} b_1^{(2)} = b_1^{(1)} \\ b_i^{(2)} = b_i^{(1)} - \frac{a_{i1}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}} \cdot b_1^{(1)}, & i = \overline{2, n} \end{cases}$$

* Si $a_{11}^{(1)} = 0$, on cherche une ligne $L_p^{(1)}$ avec $2 \leq p \leq n$ telle que $a_{p1}^{(1)} \neq 0$. puis on permute les lignes $L_1^{(1)}$ et $L_p^{(1)}$ pour obtenir

$$AX = B \iff A^{(1)}X = B^{(1)} \iff P^{(1)}A^{(1)}X = P^{(1)}B^{(1)}$$

où $P^{(1)}$ est la matrice de permutation des lignes $L_1^{(1)}$ et $L_p^{(1)}$. $P^{(1)}$ est elle même la

matrice identité dans laquelle on permute la première ligne et la P^{eme} ligne.

Dans ce cas au lieu la matrice $A^{(1)}$ on considère la matrice : $\tilde{A}^{(1)} = P^{(1)}A^{(1)}$ dont on notera encore les éléments par $a_{ij}^{(1)}$ et on lui applique des transformations analogue à celles correspondantes au cas $a_{11}^{(1)} \neq 0$, étudié plus haut.

k^{eme} étape :

* $a_{kk}^{(k)} = 0$: On permute les lignes $L_k^{(k)}$ et $L_p^{(k)}$ où $L_p^{(k)}$ est une ligne d'indice p avec $k+1 \leq p \leq n$, telle que : $a_{pk}^{(k)} \neq 0$. Et de la

$$A^{(k)}X = B^{(k)} \iff P^{(k)}A^{(k)}X = P^{(k)}B^{(k)}$$

où $P^{(k)}$ est la matrice de permutation des lignes $L_k^{(k)}$ et $L_p^{(k)}$. $P^{(k)}$ est elle même la matrice identité où on permute la k^{eme} et la P^{eme} ligne.

On considère alors : $\tilde{A}^{(k)} = P^{(k)}A^{(k)}$ et $\tilde{B}^{(k)} = P^{(k)}B^{(k)}$. Après transformation on obtient $A^{(k+1)}$ et $B^{(k+1)}$ avec :

$$\begin{cases} a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)}, & i = \overline{1, k} ; j = \overline{1, n} \\ a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} - \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}} \cdot a_{kj}^{(k)}, & i = \overline{k+1, n} ; j = \overline{1, n} \end{cases}$$

et

$$\begin{cases} b_i^{(k+1)} = b_i^{(k)} & i = \overline{1, n} \\ b_i^{(k+1)} = b_i^{(k)} - \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}} \cdot b_k^{(k)}, & i = \overline{k+1, n} \end{cases}$$

et ceci en faisant les affectations suivantes :

$$\begin{cases} L_1^{(k+1)} \leftarrow L_1^{(k)} \\ L_2^{(k+1)} \leftarrow L_2^{(k)} \\ \vdots \\ L_k^{(k+1)} \leftarrow L_k^{(k)} \\ L_i^{(k+1)} \leftarrow L_i^{(k)} - \frac{L_{ik}^{(k)}}{L_{kk}^{(k)}} \cdot L_k^{(k)}, & i = \overline{k+1, n} \end{cases}$$

Résolution de $AX = B$:

On pose

$$\left[\begin{array}{c} A \\ B \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} A^{(n)} \\ B^{(n)} \end{array} \right] = \begin{pmatrix} a_{11}^{(n)} & a_{12}^{(n)} & \dots & a_{1n}^{(n)} & b_1^{(n)} \\ 0 & a_{22}^{(n)} & \dots & a_{2n}^{(n)} & b_2^{(n)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \vdots & \dots & a_{nn}^{(n)} & b_n^{(n)} \end{pmatrix}$$

Et delà

$$\begin{aligned} AX = B &\Leftrightarrow A^{(1)}X = B^{(1)} \\ &\Leftrightarrow A^{(2)}X = B^{(2)} \\ &\vdots \\ &\Leftrightarrow A^{(n)}X = b^{(n)} \\ &\Leftrightarrow AX = B \end{aligned}$$

d'où : (**Résolution par retour arrière**)

$$\begin{cases} x_1 &= \frac{1}{a'_{11}} \cdot (b'_1 - a'_{1,2}x_2 - \dots - a'_{1,n}x_n) \\ \vdots & \\ x_{n-1} &= \frac{1}{a'_{n-1,n-1}} \cdot (b'_{n-1} - a'_{n-1,n}x_n) \\ x_n &= \frac{1}{a'_{n,n}} \cdot b'_n \end{cases}$$

(On détermine x_n , puis x_{n-1} , etc. jusqu'à obtention de x_1 .)

Remarque 2.2.6 1. La méthode de Gauss nécessite $\frac{2}{3}n^3$ opérations pour un système d'ordre n .

2. Elle permet de calculer $\det(A)$ puisque $\det(A) = (-1)^j \prod_{k=1}^n a_{kk}^{(k)}$ où j est le nombre de permutations.

Exemple 2.2.7 Soit à résoudre le système

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 & + 4x_4 = 2 \\ -4x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 7x_4 & = -9 \\ 4x_1 + x_2 - 2x_3 + 8x_4 & = 2 \\ & - 3x_2 - 12x_3 - x_4 = 2 \end{cases} \quad (2.1)$$

Le système (2.1) s'écrit encore : $AX = B$ avec

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 4 \\ -4 & -2 & 3 & -7 \\ 4 & 1 & -2 & 8 \\ 0 & -3 & -12 & -1 \end{pmatrix} ; \quad B = \begin{pmatrix} 2 \\ -9 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

1^{ère} étape :

* Le pivot $a_{11}^{(1)} = 2 \neq 0$

$$\begin{pmatrix} \boxed{2} & 1 & 0 & 4 & 2 \\ -4 & -2 & 3 & -7 & -9 \\ 4 & 1 & -2 & 8 & 2 \\ 0 & -3 & -12 & -1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & \boxed{0} & 3 & 1 & -5 \\ 0 & -1 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & -3 & -12 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\left[A^{(1)} : B^{(1)} \right] \rightarrow \left[A^{(2)} : B^{(2)} \right]$$

2^{ème} étape :

Dans $\left[A^{(2)} : B^{(2)} \right]$ on constate que le pivot $a_{22}^{(2)} = 0$. D'où on fait une permutation des lignes 2 et 3 (par exemple). Ce qui revient à considérer $\left[\tilde{A}^{(2)} : \tilde{B}^{(2)} \right]$ avec :

$$\left\{ \begin{array}{l} \tilde{A}^{(2)} = P^{(2)} A^{(2)} \\ \tilde{B}^{(2)} = P^{(2)} B^{(2)} \end{array} \right\} \quad \text{où} \quad P^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

On a alors : Le pivot $a_{22}^{(2)} \neq 0$ ($a_{22}^{(2)} = \tilde{a}_{22}^{(2)} = -1$) et

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & \boxed{-1} & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & -5 \\ 0 & -3 & -12 & -1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & -1 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & -6 & -1 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\left[\tilde{A}^{(2)} : \tilde{B}^{(2)} \right] \rightarrow \left[A^{(3)} : B^{(3)} \right]$$

3^{ème} étape :

Solution 2.2.8 Le pivot $a_{33}^{(3)} = 3 \neq 0$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & -1 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & \boxed{3} & 1 & -5 \\ 0 & -3 & -12 & -1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & -1 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\left[A^{(3)} : B^{(3)} \right] \rightarrow \left[A^{(4)} : B^{(4)} \right]$$

Résolution de $AX = B'$:

Posons $\left[A' : B' \right] = \left[A^{(4)} : B^{(4)} \right]$. On a alors :

$$AX = B' \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -5 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x_1 + x_2 + 4x_4 = 2 \\ -x_2 - 2x_3 = -2 \\ 3x_3 + x_4 = -5 \\ x_4 = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 3 \\ x_2 = 4 \\ x_3 = -1 \\ x_4 = -2 \end{cases}$$

Méthode de Gauss-Jordan :

Soit le système linéaire $AX = B$ où A est une matrice $(n \times n)$, régulière.

Principe : * Transformation de la matrice A en la matrice identité

ie : $\left[A : B \right]$ - transformation $\rightarrow \left[I : B \right]$ où I est la matrice identité

* D'où : $AX = B \Leftrightarrow I \cdot X = B' \Leftrightarrow X = B'$

ETAPES : 1^{ère} étape :

* Si $a_{11}^{(1)} \neq 0$, on fait les effectations suivantes

- $L_1^{(2)} \leftarrow \frac{1}{a_{11}^{(1)}} \cdot L_1^{(1)}$
- $L_i^{(2)} \leftarrow L_i^{(1)} - a_{i1}^{(1)} \cdot L_1^{(2)}$; $i = \overline{2, n}$

On a alors :

$$\begin{pmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ a_{21}^{(1)} & a_{22}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} & b_2^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1}^{(1)} & a_{n2}^{(1)} & \cdots & a_{nn}^{(1)} & b_n^{(1)} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & a_{12}^{(2)} & \cdots & a_{1n}^{(2)} & b_1^{(2)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n2}^{(2)} & \cdots & a_{nn}^{(2)} & b_n^{(2)} \end{pmatrix}$$

$$\left[A^{(1)} : B^{(1)} \right] \rightarrow \left[A^{(2)} : B^{(2)} \right]$$

avec :

$$\begin{cases} a_{1j}^{(2)} = \frac{a_{1j}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}} & j = \overline{1, n} \\ a_{ij}^{(2)} = a_{ij}^{(1)} - a_{i1}^{(1)} \cdot a_{1j}^{(2)}, & i = \overline{2, n}; j = \overline{1, n} \\ a_{ij}^{(2)} = 0, & i = \overline{2, n}; j = 1 \end{cases}$$

et

$$\begin{cases} b_1^{(2)} = \frac{b_1^{(1)}}{a_{11}^{(1)}} \\ b_i^{(2)} = b_i^{(1)} - a_{i1}^{(1)} \cdot b_1^{(2)}, & i = \overline{2, n} \end{cases}$$

2^{eme} étape :

* Si $a_{22}^{(2)} \neq 0$, on fait les affectations

- $L_2^{(3)} \leftarrow \frac{1}{a_{22}^{(2)}} \cdot L_2^{(2)}$
- $L_i^{(3)} \leftarrow L_i^{(2)} - a_{i2}^{(2)} \cdot L_2^{(3)} \quad ; \quad i = \overline{1, n} \quad \text{avec} \quad i \neq 2$

d'où :

$$\begin{pmatrix} 1 & a_{12}^{(2)} & \cdots & a_{1n}^{(2)} & b_1^{(2)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n2}^{(2)} & \cdots & a_{nn}^{(2)} & b_n^{(2)} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & a_{13}^{(3)} & \cdots & a_{1n}^{(3)} & b_1^{(3)} \\ 0 & 1 & a_{23}^{(3)} & \cdots & a_{2n}^{(3)} & b_2^{(3)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & a_{n3}^{(3)} & \cdots & a_{nn}^{(3)} & b_n^{(3)} \end{pmatrix}$$

$$\left[A^{(2)} : B^{(2)} \right] \rightarrow \left[A^{(3)} : B^{(3)} \right]$$

avec :

$$\begin{cases} a_{2j}^{(3)} = \frac{a_{2j}^{(2)}}{a_{22}^{(2)}} & j = \overline{2, n} \\ a_{ij}^{(3)} = a_{ij}^{(2)} - a_{i2}^{(2)} \cdot a_{2j}^{(3)}, & i = \overline{1, n}; i \neq 2; j = \overline{3, n} \end{cases}$$

et

$$\begin{cases} b_2^{(3)} = \frac{b_2^{(2)}}{a_{22}^{(2)}} \\ b_i^{(3)} = b_i^{(2)} - a_{i2}^{(2)} \cdot b_2^{(3)}, & i = \overline{1, n}; i \neq 2 \end{cases}$$

k^{eme} étape :

* $a_{kk}^{(k)} \neq 0$:

$$\begin{aligned} & \bullet L_k^{(k+1)} \leftarrow \frac{1}{a_{kk}^{(k)}} \cdot L_k^{(k)} \\ & \bullet L_i^{(k+1)} \leftarrow L_i^{(k)} - a_{ik}^{(k)} \cdot L_k^{(k+1)} \quad ; \quad i = \overline{1, n} \quad \text{avec} \quad i \neq k \end{aligned}$$

On obtient :

$$\begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 & a_{1k}^{(k)} & \dots & a_{1n}^{(k)} & b_1^{(k)} \\ 0 & \dots & 0 & a_{2k}^{(k)} & \dots & a_{2n}^{(k)} & b_2^{(k)} \\ \vdots & & & & & & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & a_{k-1,k}^{(k)} & \dots & a_{k-1,n}^{(k)} & b_{k-1}^{(k)} \\ 0 & \dots & 0 & a_{kk}^{(k)} & \dots & a_{kn}^{(k)} & b_k^{(k)} \\ \vdots & & & & & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{nk}^{(k)} & \dots & a_{nn}^{(k)} & b_n^{(k)} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 & a_{1,k+1}^{(k+1)} & \dots & a_{1n}^{(k+1)} & b_1^{(k+1)} \\ 0 & \dots & 0 & a_{2,k+1}^{(k+1)} & \dots & a_{2n}^{(k+1)} & b_2^{(k+1)} \\ \vdots & & & & & & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & a_{k,k+1}^{(k+1)} & \dots & a_{k,n}^{(k+1)} & b_k^{(k+1)} \\ 0 & \dots & 0 & a_{k+1,k+1}^{(k+1)} & \dots & a_{k+1,n}^{(k+1)} & b_{k+1}^{(k+1)} \\ \vdots & & & & & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{n,k+1}^{(k+1)} & \dots & a_{nn}^{(k+1)} & b_n^{(k+1)} \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} A^{(k)} \\ B^{(k)} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} A^{(k+1)} \\ B^{(k+1)} \end{bmatrix}$$

avec :

$$\begin{cases} a_{kj}^{(k+1)} = \frac{a_{kj}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}} & j = \overline{k, n} \\ a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} - a_{ik}^{(k)} \cdot a_{kj}^{(k)}, & i = \overline{1, n}; i \neq k; j = \overline{k+1, n} \end{cases}$$

et

$$\begin{cases} b_k^{(k+1)} = \frac{b_k^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}} \\ b_i^{(k+1)} = b_i^{(k)} - a_{ik}^{(k)} \cdot b_k^{(k+1)}, & i = \overline{1, n}; i \neq k \end{cases}$$

Remarque 2.2.9 1. La méthode de Gauss-Jordan nécessite n^3 opérations élémentaires

(moins rapide que celle de Gauss et que celle Cholesky que l'on verra par la suite).

2. Elle est conseillée pour inverser une matrice, car elle évite la "remontée" (ie : la résolution par retour arrière) qu'en rencontre dans la méthode de Gauss.

Exemple 2.2.10 Soit à résoudre le système :

$$(1) \quad \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 5 \\ 4x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 3 \\ -2x_1 + 3x_2 - x_3 = 1 \end{cases}$$

Le système (1) s'écrit encore : $AX = B$ avec

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & 4 & -3 \\ -2 & 3 & -1 \end{pmatrix} ; \quad B = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} ; \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

1^{ère} étape :

$$* a_{11}^{(1)} = 2 \neq 0$$

$$\begin{pmatrix} \boxed{2} & 3 & -1 & 5 \\ 4 & 4 & -3 & 3 \\ -2 & 3 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3/2 & -1/2 & 5/2 \\ 0 & -2 & -1 & -7 \\ 0 & 6 & -2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\left[A^{(1)} : B^{(1)} \right] \rightarrow \left[A^{(2)} : B^{(2)} \right]$$

2^{ème} étape :

$$* a_{22}^{(2)} = -2 \neq 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3/2 & -1/2 & 5/2 \\ 0 & \boxed{-2} & -1 & -7 \\ 0 & 6 & -2 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -5/4 & -11/2 \\ 0 & 1 & 1/2 & 7/2 \\ 0 & 0 & -5 & -15 \end{pmatrix}$$

$$\left[A^{(2)} : B^{(2)} \right] \rightarrow \left[A^{(3)} : B^{(3)} \right]$$

3^{ème} étape :

$$* a_{33}^{(3)} = -5 \neq 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -5/4 & -11/2 \\ 0 & 1 & 1/2 & 7/2 \\ 0 & 0 & \boxed{-5} & -15 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\left[A^{(3)} : B^{(3)} \right] \rightarrow \left[A^{(4)} : B^{(4)} \right]$$

Solution 2.2.11 *Solution de $AX = B'$*

Posons $B = B^{(4)}$. On a alors : $X = B' = (1, 2, 3)$.

Stratégie du choix du pivot

Introduction :

Exemple 2.2.12 *Sachant que la solution exacte du système ci-après est $(x_1, x_2) = (1/3, 2/3)$, retrouvons la par la méthode de Gauss. Le système est*

$$\begin{cases} 0.0003x_1 + 3x_2 = 2.0001 \\ x_1 + x_2 = 1 \end{cases}$$

* Posons

$$A = \begin{pmatrix} 0.0003 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 2.0001 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Nous avons : $a_{11} = 0.0003 \neq 0$, d'où :

$$\begin{pmatrix} 0.0003 & 3 & 2.0001 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0.0003 & 3 & 2.0001 \\ 0 & -9999 & -6666 \end{pmatrix}$$

$$\left[A : B \right] \rightarrow \left[A' : B' \right]$$

et delà

$$x_2 = \frac{6666}{9999} = \frac{2222}{3333} = ?$$

$$x_1 = \frac{1}{0.0003} \cdot (2.0001 - 3x_2) = ?$$

Question 1 : Effectuer les calculs avec quatre (04) c.s

Réponse 1 : $x_2 = 0.6667$ et $x_1 = -0.3333$

Question 2 : même question avec cinq (05) c.s

Réponse 2 : $x_2 = 0.66667$ et $x_1 = 0.3$

Question 3 : avec trois (03) c.s

Réponse 3 : $x_2 = 0.667$ et $x_1 = -3$

Exemple 2.2.13

1. Les chiffres de la valeur x_2 restent stables. Par contre ceux de x_1 mûtent à chaque nouvelle précision.

2. Les solutions auxquelles on aboutit sont, à des échelles différentes, éloignées de la solution exacte.

Commentaire : Cette perte dans la précision est dû au pivot $a_{11} = 0.0003$ qui est très petit.

Cas général Soit la système

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

avec $a_{11} \simeq 0$ et $a_{11} \neq 0$.

On suppose que les solutions exactes $x_1, x_2, \dots, x_n$ soient connues. Posons :

$$\begin{cases} x_1 = x_1^* \pm \Delta x_1 \\ x_2 = x_2^* \pm \Delta x_2 \\ \vdots \\ x_n = x_n^* \pm \Delta x_n \end{cases} \quad \text{où } x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^* \text{ sont des valeurs} \\ \text{approchées de } x_1, x_2, \dots, x_n$$

Déterminons $\Delta x_1 = ?$

Nous avons :

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{a_{11}}(b_1 - a_{12}x_2 - \dots - a_{1n}x_n) \\ &= \frac{1}{a_{11}}(b_1 - a_{12}x_2^* - \dots - a_{1n}x_n^* \mp a_{12}\Delta x_2 \mp \dots \mp a_{1n}\Delta x_n) \\ &= \frac{1}{a_{11}}(b_1 - a_{12}x_2^* - \dots - a_{1n}x_n^*) \mp a_{12}\Delta x_2 \mp \dots \mp a_{1n}\Delta x_n \\ &= x_1^* \mp \frac{a_{12}}{a_{11}}\Delta x_2 \mp \dots \mp \frac{a_{1n}}{a_{11}}\Delta x_n \end{aligned}$$

et delà : $\Delta x_1 = \mp \frac{a_{12}}{a_{11}} \Delta x_2 \mp \dots \mp \frac{a_{1n}}{a_{11}} \Delta x_n$. Mais puisque $a_{11} \simeq 0$ alors $\frac{a_{12}}{a_{11}} > 0$.
 De même pour les autres $\frac{a_{1j}}{a_{11}}$, $j=3, n$. Et donc l'erreur Δx_1 sera importante.

Stratégie du pivot partiel Supposons que l'on soit à la k^{eme} étape de la méthodes de Gauss :

$$\left[A^{(k)} : B^{(k)} \right] = \begin{pmatrix} a_{11}^{(k)} & a_{12}^{(k)} & \dots & a_{1k}^{(k)} & \dots & a_{1n}^{(k)} & b_1^{(k)} \\ 0 & a_{22}^{(k)} & \dots & a_{2k}^{(k)} & \dots & a_{2n}^{(k)} & b_2^{(k)} \\ \vdots & & & & & & \\ 0 & & \dots & 0 & a_{kk}^{(k)} & \dots & a_{kn}^{(k)} & b_k^{(k)} \\ \vdots & \vdots & & & & & & \\ 0 & & \dots & 0 & a_{nk}^{(k)} & \dots & a_{nn}^{(k)} & b_n^{(k)} \end{pmatrix} \quad 1 \leq k \leq n$$

Parmi les coefficients $a_{kk}^{(k)}, a_{k+1,k}^{(k)}, \dots, a_{nk}^{(k)}$, on choisit celui dont le module est le plus grand $\left(ie : \max_{i=\overline{k,n}} (|a_{ik}^{(k)}|) \right)$. Le pivot sera ce coefficient, et on permute alors la k^{eme} ligne et la ligne du pivot ainsi obtenu.

Exemple 2.2.14 Soit à résoudre le système suivant par la méthode de Gauss (avec permutations) en utilisant la stratégie du pivot partiel.

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + 6x_3 = 11 \end{cases}$$

On construit :

$$\left[A : B \right] = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 6 & 11 \end{pmatrix}$$

$\boxed{k=1}$: $\max(1, 1, 3) = 3$ et donc on permute, par exemple, les lignes 1et 3 pour obtenir :

$$\begin{pmatrix} \boxed{3} & 2 & 6 & 11 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 2 & 6 & 11 \\ 0 & 1/3 & -2 & -8/3 \\ 0 & 7/3 & 1 & -11/3 \end{pmatrix}$$

$\boxed{k=2}$: $\max(1/3, 7/3) = 7/3$. On permute les lignes 2 et 3 :

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 6 & 11 \\ 0 & \boxed{7/3} & 1 & -11/3 \\ 0 & 1/3 & -2 & -8/3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 2 & 6 & 11 \\ 0 & 7/3 & 1 & -11/3 \\ 0 & 0 & -15/7 & -15/7 \end{pmatrix}$$

Et delà :

$$AX = B \Leftrightarrow \begin{cases} x_3 = 1 \\ x_2 = \frac{3}{7} \left(\frac{-11}{3} - x_3 \right) \\ x_1 = \frac{1}{3} (11 - 2x_2 - 6x_3) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_3 = 1 \\ x_2 = -2 \\ x_1 = 3 \end{cases}$$

Stratégie du pivot partiel composé Pour chaque ligne L_i de la matrice initiale on calcule :

$$d_i = \max(|a_{i1}|, |a_{i2}|, \dots, |a_{in}|) = \max_{j=1,n}(|a_{ij}|)$$

Puis, à la k^{eme} étape, parmi les valeurs : $\frac{a_{kk}^{(k)}}{d_k}, \frac{a_{k+1,k}^{(k)}}{d_{k+1}}, \dots, \frac{a_{nk}^{(k)}}{d_n}$, on choisit celle dont le module est le plus grand (ie : $\max_{i=k,n} \left(\frac{a_{ik}^{(k)}}{d_i} \right)$), puis on permute la ligne du pivot correspondant à cette valeur et la k^{eme} ligne.

Exemple 2.2.15 Soit à résoudre le système suivant par la méthode de Gauss en utilisant la stratégie du pivot partiel composé :

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 5 \\ 4x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 3 \\ -2x_1 + 3x_2 - x_3 = 1 \end{cases}$$

Posons :

$$[A; B] = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 5 \\ 4 & 4 & -3 & 3 \\ -2 & 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

On a : $d_1 = \max(2, 3, 1) = 3$, $d_2 = \max(4, 4, 3) = 4$ et $d_3 = \max(2, 3, 1) = 3$

$\boxed{k=1}$: $\max \left(\frac{|a_{11}|}{d_1}, \frac{|a_{21}|}{d_2}, \frac{|a_{31}|}{d_3} \right) = \left(\frac{2}{3}, \frac{4}{4}, \frac{2}{3} \right) = \frac{4}{4} = 1$. Et donc la ligne du pivot est

L_2 (le pivot étant a_{21}). On permute les lignes 1 et 2 pour obtenir :

$$\begin{pmatrix} \boxed{4} & 4 & -3 & 3 \\ 2 & 3 & -1 & 5 \\ -2 & 3 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 4 & 4 & -3 & 3 \\ 0 & 1 & 1/2 & 7/2 \\ 0 & 5 & -5/2 & 5/2 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{k=2} : \max \left(\frac{|a_{22}^{(2)}|}{d_2}, \frac{|a_{32}^{(2)}|}{d_3} \right) = \max \left(\frac{1}{4}, \frac{5}{3} \right) = \frac{5}{3}. \text{ La ligne du pivot est alors } L_3.$$

On permute les lignes 2 et 3 :

$$\begin{pmatrix} 4 & 4 & -3 & 3 \\ 0 & \boxed{5} & -5/2 & 5/2 \\ 0 & 1 & 1/2 & 7/2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 4 & 4 & -3 & 3 \\ 0 & 5 & -5/2 & 5/2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Et delà :

$$\begin{cases} x_3 = 3 \\ x_2 = 2 \\ x_1 = 1 \end{cases}$$

Stratégie du pivot total A la k^{eme} étape le pivot est choisit parmi les coefficients $a_{ij}^{(k)}$,

$i = \overline{k, n}$ $j = \overline{k, n}$, tel que son module soit le plus grand (ie : $\max_{i=\overline{k, n}} \max_{j=\overline{k, n}} (|a_{ij}^{(k)}|)$).

Attention! : A chaque permutation de colonnes les inconnues changent de places.

Exemple 2.2.16

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 3x_3 = -2 \\ 2x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 7 \\ 3x_1 + 2x_2 + 6x_3 = 12 \end{cases}$$

Posons :

$$[A: B] = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 & -2 \\ 2 & 2 & 5 & 7 \\ 3 & 2 & 6 & 12 \end{pmatrix}$$

$\boxed{k=1} : \max(|a_{ij}^{(1)}|, i=1,2,3 \quad j=1,2,3) = 6$ La ligne du pivot total sera alors L_3 . En permutant les lignes 1 et 3 on obtient :

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 6 & 12 \\ 2 & 2 & 5 & 7 \\ 1 & 3 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

La colonne du pivot total est Col_3 , et on permute les colonnes 1 et 3 :

$$\begin{pmatrix} \boxed{6} & 2 & 3 & 12 \\ 5 & 2 & 2 & 7 \\ 3 & 3 & 1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 6 & 2 & 3 & 12 \\ 0 & 1/3 & -1/2 & -3 \\ 0 & 2 & -1/2 & -8 \end{pmatrix}$$

$\boxed{k=2}$: $\max(|a_{ij}^{(2)}|, i=2,3 \quad j=2,3) = 2$. La ligne du pivot total est alors L_3 . Et donc on permute les lignes 2 et 3 :

$$\begin{pmatrix} 6 & 2 & 3 & 12 \\ 0 & \boxed{2} & -1/2 & -8 \\ 0 & 1/3 & -1/2 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 6 & 2 & 3 & 12 \\ 0 & 2 & -1/2 & -8 \\ 0 & 0 & -5/12 & -5/3 \end{pmatrix}$$

Delà, du fait de la permutation des colonnes 1 et 3. On obtient le système équivalent suivant :

$$\begin{cases} 6x_3 + 2x_2 + 3x_1 = 12 \\ 2x_2 - \frac{1}{2}x_1 = -8 \\ -\frac{5}{12}x_1 = -\frac{5}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = -3 \\ x_3 = 4 \end{cases}$$

Décomposition de A en L.U

Soit le système linéaire $AX = B$ (1)

Principe : Décomposition de la matrice A de façon à la mettre sous la forme $A = L.U$ où L est une matrice triangulaire unitaire inférieure et U une matrice triangulaire supérieure.

Résolution : Le système (1) devient :

$$AX = B \Leftrightarrow \underbrace{LUX}_y = B \Leftrightarrow \begin{cases} Ly = B \\ UX = y \end{cases}$$

Donc la résolution du système $AX = B$ revient à la résolutions des deux systèmes $Ly = B$ et $UX = y$, et la résolution de ces derniers est immédiate, puisque les matrices L et U sont triangulaires.

Méthode :

Par la méthode de Gauss on obtient

$$\begin{aligned} \left[A' : B' \right] &= \left[A^{(n)} : B^{(n)} \right] = \begin{pmatrix} a_{11}^{(n)} & a_{12}^{(n)} & a_{13}^{(n)} & \dots & a_{1n}^{(n)} & b_1^{(n)} \\ 0 & a_{22}^{(n)} & a_{23}^{(n)} & \dots & a_{2n}^{(n)} & b_2^{(n)} \\ 0 & 0 & a_{33}^{(n)} & \dots & a_{3n}^{(n)} & b_3^{(n)} \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & a_{nn}^{(n)} & b_n^{(n)} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \dots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & \dots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ 0 & 0 & a_{33}^{(3)} & \dots & a_{3n}^{(3)} & b_3^{(3)} \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & a_{nn}^{(n)} & b_n^{(n)} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

avec : $AX = B \Leftrightarrow AX = B'$

On pose alors $U = A'$

$$ie : U = \begin{pmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \dots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & \dots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ 0 & 0 & a_{33}^{(3)} & \dots & a_{3n}^{(3)} & b_3^{(3)} \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & a_{nn}^{(n)} & b_n^{(n)} \end{pmatrix}$$

et on montre que : $A = L.U$ où

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ l_{21} & 1 & \dots & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \dots & \dots & l_{n,n-1} & 1 \end{pmatrix} \quad \text{avec } l_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}$$

Vérification : Pour $n = 4$

$$U = \begin{pmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & a_{14}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & a_{24}^{(2)} \\ 0 & 0 & a_{33}^{(3)} & a_{34}^{(3)} \\ 0 & 0 & 0 & a_{44}^{(4)} \end{pmatrix} ; \quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 & 0 \\ l_{41} & l_{42} & l_{43} & 1 \end{pmatrix} \quad l_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}$$

d'où

$$\begin{aligned}
l_{21} &= \frac{a_{21}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}} = \frac{a_{21}}{a_{11}} & l_{31} &= \frac{a_{31}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}} = \frac{a_{31}}{a_{11}} & l_{41} &= \frac{a_{41}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}} = \frac{a_{41}}{a_{11}} \\
l_{32} &= \frac{a_{32}^{(2)}}{a_{22}^{(2)}} & l_{42} &= \frac{a_{42}^{(2)}}{a_{22}^{(2)}} & l_{43} &= \frac{a_{43}^{(3)}}{a_{33}^{(3)}}
\end{aligned}$$

Ainsi

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{a_{21}}{a_{11}} & 1 & 0 & 0 \\ \frac{a_{31}}{a_{11}} & \frac{a_{32}^{(2)}}{a_{22}^{(2)}} & 1 & 0 \\ \frac{a_{41}}{a_{11}} & \frac{a_{42}^{(2)}}{a_{22}^{(2)}} & \frac{a_{43}^{(3)}}{a_{33}^{(3)}} & 1 \end{pmatrix}$$

et

$$L \cdot U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{a_{21}}{a_{11}} & 1 & 0 & 0 \\ \frac{a_{31}}{a_{11}} & \frac{a_{32}^{(2)}}{a_{22}^{(2)}} & 1 & 0 \\ \frac{a_{41}}{a_{11}} & \frac{a_{42}^{(2)}}{a_{22}^{(2)}} & \frac{a_{43}^{(3)}}{a_{33}^{(3)}} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & a_{24}^{(2)} \\ 0 & 0 & a_{33}^{(3)} & a_{34}^{(3)} \\ 0 & 0 & 0 & a_{44}^{(4)} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{21} \frac{a_{21}}{a_{11}} + a_{22}^{(2)} & a_{21} \frac{a_{13}}{a_{11}} + a_{23}^{(2)} & a_{21} \frac{a_{14}}{a_{11}} + a_{24}^{(2)} \\ a_{31} & a_{31} \frac{a_{21}}{a_{11}} + a_{32}^{(2)} & a_{31} \frac{a_{13}}{a_{11}} + a_{32}^{(2)} \frac{a_{23}^{(2)}}{a_{22}^{(2)}} + a_{33}^{(3)} & a_{31} \frac{a_{14}}{a_{11}} + a_{32}^{(2)} \frac{a_{24}^{(2)}}{a_{22}^{(2)}} + a_{34}^{(3)} \\ a_{41} & a_{41} \frac{a_{21}}{a_{11}} + a_{42}^{(2)} & a_{41} \frac{a_{13}}{a_{11}} + a_{42}^{(2)} \frac{a_{23}^{(2)}}{a_{22}^{(2)}} + a_{43}^{(3)} & a_{41} \frac{a_{14}}{a_{11}} + a_{42}^{(2)} \frac{a_{24}^{(2)}}{a_{22}^{(2)}} + a_{43}^{(3)} \frac{a_{34}^{(3)}}{a_{33}^{(3)}} + a_{44}^{(4)} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix} = A \quad \text{car} \quad a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} + a_{ik}^{(k)} \frac{a_{jk}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}$$

Méthode de Cholesky

Soit A une matrice carrée d'ordre n ; $A = (a_{ij}) \quad i, j = \overline{1, n}$

Définition 2.2.17

- A est dite *symétrique* si elle coïncide avec sa transposée ie : $A = A^T$ ou encore : $a_{ij} = a_{ji}, \quad i, j = \overline{1, n}$
- A est dite *définie positive* si $\forall X \in \mathbb{R}^n, x \neq 0, \langle AX, X \rangle = X^T A X > 0$.

Théorème 2.2.18 A est définie positive si et seulement si tous ses mineurs :

$$\Delta_1 = a_{11} \quad ; \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \quad ; \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad \dots, \Delta_n = \det(A)$$

sont strictement positifs.

Théorème 2.2.19 (Cholesky) Soit A une matrice carrée d'ordre n , non singulière et symétrique. Pour qu'il existe une matrice triangulaire inférieure L , de même dimension que A , telle que : $A = LL^T$, il faut et il suffit que A soit définie positive.

Remarque 2.2.20

- L n'est pas unique
- La décomposition devient unique si l'on fixe à l'avance les éléments diagonaux l_{ii}

avec $l_{ii} > 0$.

Algorithm 2.2.21 de décomposition :

Afin d'obtenir les éléments l_{ij} de la matrice L on multiplie les matrices L et L^T , puis on identifie les coefficients respectifs dans l'égalité : $A = LL^T$ pour obtenir les équations

$$\begin{cases} l_{11}^2 = a_{11} \\ l_{i1}^2 + l_{i2}^2 + l_{i3}^2 + \dots + l_{i,i-1}^2 + l_{ii}^2 = a_{ii} \\ l_{i1}l_{ji} + l_{i2}l_{j2} + l_{i3}l_{j3} + \dots + l_{ij}l_{jj} = a_{ij}, \quad i > j \\ l_{ij} = 0 \quad i < j \end{cases}$$

d'où l'on déduit successivement (en choisissant systématiquement le signe +) :

$$\left\{ \begin{array}{l} l_{11} = \sqrt{a_{11}} \\ l_{ii} = \sqrt{a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}^2}, \quad i = \overline{2, n} \\ l_{ij} = \frac{1}{l_{jj}} \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} l_{jk} \right), \quad i > j \\ l_{ij} = 0, \quad i < j \end{array} \right.$$

Résolution de $AX = B$

Résoudre le système $AX = B$ revient alors à résoudre :

$$\underbrace{LL^T X}_y = B \iff \begin{cases} Ly = B \\ L^T X = y \end{cases}$$

d'où l'on déduit :

$$\begin{cases} y_1 = \frac{b_1}{l_{11}} \\ y_i = \frac{1}{l_{ii}} \left(b_i - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} y_k \right) \quad i = \overline{2, n} \end{cases}$$

et

$$\begin{cases} x_n = \frac{y_n}{l_{nn}} \\ x_i = \frac{1}{l_{ii}} \left(y_i - \sum_{k=i+1}^n l_{ik} x_k \right) \quad i = \overline{1, n-1} \end{cases}$$

Remarque 2.2.22 1. La méthode de Cholesky nécessite $\frac{n^3}{3}$ opérations élémentaires (meilleure que celle de Gauss).

2. La méthode de Cholesky permet le calcul du déterminant de A .

En effet : $A = LL^T \implies \det(A) = \det(LL^T) = \det(L) \det(L^T) = (\det(L))^2 =$

$$\left(\prod_{i=1}^n l_{ii} \right)^2.$$

2.2.4 Méthodes itératives

Lorsque n est très grand, la résolution d'un système d'ordre n par les méthodes directes devient assez compliquée. Alors on fait appel aux méthodes dites itératives sous

réserve de convergente vers la solution (exacte) x du système :

$$AX = B \quad (2.2)$$

Méthode de Jacobi

On suppose que les $a_{ii} \neq 0$, $\forall i = \overline{1, n}$ où $A = (a_{ij})$. Le système (2.2) s'écrit encore :

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

Le principe de la méthode consiste à résoudre la i^{eme} équation par rapport à l'inconnue x_i , On obtient alors le système équivalent, qu'on appelle système réduit :

$$\begin{cases} x_1 = \beta_1 + \alpha_{12}x_2 + \alpha_{13}x_3 + \alpha_{14}x_4 \dots + \alpha_{1n}x_n \\ x_2 = \beta_2 + \alpha_{21}x_1 + \alpha_{23}x_3 + \alpha_{24}x_4 \dots + \alpha_{2n}x_n \\ \vdots \\ x_n = \beta_n + \alpha_{n1}x_1 + \alpha_{n2}x_2 + \alpha_{n3}x_3 \dots + \alpha_{n,n-1}x_{n-1} \end{cases}$$

$$\text{où } \beta_i = \frac{b_i}{a_{ii}}, \quad i = \overline{1, n} \quad \text{et} \quad \begin{cases} \alpha_{ij} = -\frac{a_{ij}}{a_{ii}} & i \neq j \quad i, j = \overline{1, n} \\ \alpha_{ii} = 0 & i = \overline{1, n} \end{cases}$$

Le système réduit ainsi obtenu s'écrit sous forme matricielle comme suit

$$X = \alpha X + \beta \quad \text{où} \quad \alpha = (\alpha_{ij}) \quad \text{et} \quad \beta = (\beta_i) \quad (2.3)$$

avec

$$\alpha = \begin{pmatrix} 0 & \alpha_{12} & \alpha_{13} & \dots & \dots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & 0 & \alpha_{23} & \dots & \dots & \alpha_{2n} \\ \vdots & & \ddots & & & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \dots & \dots & \alpha_{n,n-1} & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \beta = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

Conclusion 2.2.23 *Le système $AX = B$ devient équivalent au système réduit $X = \alpha X + \beta$ ie :*

$$(2.2) \quad AX = B \iff (2.3) \quad X = \alpha X + \beta \quad \text{forme récursive}$$

Et delà, en partant d'une approximation initiale arbitraire $X^{(0)}$ (en général on prend $X^{(0)} = \beta$), on résoud le système :

$$X^{(k+1)} = \alpha X^{(k)} + \beta; \quad k \in \mathbb{N}. \quad (2.4)$$

Si la suite des approximations $X^{(0)}, X^{(1)}, \dots, X^{(k)}, \dots$, possède une limite $X = \lim_{k \rightarrow +\infty} X^{(k)}$, cette limite est solution du système (2.3), et donc du système (2.2).

En effet :

Il suffit de passé à la limite (2.4) pour obtenir :

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} X^{(k+1)} = \alpha \lim_{k \rightarrow +\infty} X^{(k)} + \beta \iff X = \alpha X + \beta \iff AX = B$$

Algorithm 2.2.24 Ecrivons le système (2.4) sous la forme développée :

$$X^{(k+1)} = \alpha X^{(k)} + \beta \iff x_i^{(k+1)} = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \alpha_{ij} x_i^{(k)} + \beta_i, \quad i = \overline{1, n} \text{ où } \alpha_{ij} = -\frac{a_{ij}}{a_{ii}} \text{ et } \beta_i = -\frac{b_i}{a_{ii}}$$

$$\iff x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left[b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{ij} x_i^{(k)} \right] \quad i = \overline{1, n}$$

$$\iff x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left[b_i - \sum_{j < i}^n a_{ij} x_i^{(k)} - \sum_{j > i}^n a_{ij} x_i^{(k)} \right] \quad i = \overline{1, n}$$

D'où : **Algorithme de Jacobi**

$$\begin{cases} X^{(0)} \text{ donné} \\ x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left[b_i - \sum_{j < i}^n a_{ij} x_j^{(k)} - \sum_{j > i}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right] \quad i = \overline{1, n} \end{cases}$$

Critère d'arrêt

Soit $k \in \mathbb{N}$ et $p \in \mathbb{N}^*$. On a :

$$\begin{aligned}
\|X^{(k+1)} - X^{(k)}\| &\leq \|X^{(k+p)} - X^{(k+p-1)}\| + \|X^{(k+p-1)} - X^{(k+p-2)}\| + \dots + \|X^{(k+1)} - X^{(k)}\| \\
&\leq \|X^{(k+1)} - X^{(k)}\| + \|\alpha\| \|X^{(k+1)} - X^{(k)}\| + \dots + \|\alpha\|^{p-1} \|X^{(k+1)} - X^{(k)}\| \\
&\leq \|X^{(k+1)} - X^{(k)}\| (1 + \|\alpha\| + \dots + \|\alpha\|^{p-1}) \\
&\leq \|X^{(k+1)} - X^{(k)}\| \frac{1 - \|\alpha\|^p}{1 - \|\alpha\|}
\end{aligned}$$

d'où, lorsque $p \rightarrow +\infty$, k fixé, et pour $\|\alpha\| < 1$, on aura :

$$\|X - X^{(k)}\| \leq \frac{\|X^{(k+1)} - X^{(k)}\|}{1 - \|\alpha\|}$$

et pour obtenir une approximation $X^{(k)}$ de X avec la n^{eme} décimale qui est exacte, il suffit de poser :

$$\frac{\|X^{(k+1)} - X^{(k)}\|}{1 - \|\alpha\|} \leq 0.5 \cdot 10^{-n}$$

et donc aller dans les itérations jusqu'à ce que l'inégalité

$$\|X^{(k+1)} - X^{(k)}\| \leq (1 - \|\alpha\|) 0.5 \cdot 10^{-n}$$

soit vérifiée

Remarque 2.2.25 1. En pratique on va dans les itérations jusqu'à atteindre la précision ε donnée au préalable, ie : $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| \leq \varepsilon$.

2. Si on prend $X^{(0)} = \beta$, on aura : $X^{(1)} = \alpha X^{(0)} + \beta \implies X^{(1)} - X^{(0)} = \alpha\beta$ d'où :

$$\|X - X^{(k)}\| \leq \frac{\|X^{(k+1)} - X^{(k)}\|}{1 - \|\alpha\|} \leq \frac{\|\alpha\|^{k+1} \|\beta\|}{1 - \|\alpha\|}$$

et on posant :

$$\frac{\|\alpha\|^{k+1} \|\beta\|}{1 - \|\alpha\|} \leq \varepsilon$$

on déduit le nombre suffisant d'itérations pour calculer une solution approchée avec la précision ε .

Convergence de la méthode de Jacobi

Théorème 2.2.26 Une condition nécessaire et suffisante pour que l'algorithme de Jacobi converge, indépendamment de la condition initiale $X^{(0)}$, est que :

$$\rho(\alpha) < 1 \quad \text{où} \quad \rho(\alpha) = \max_{i=1,n} |\lambda_i| \quad \lambda_i : \text{valeur propre de } \alpha$$

Remarque 2.2.27

1. En pratique, le calcul de $\rho(\alpha)$ est très compliqué, il suffit alors de vérifier si $\|\alpha\| < 1$ puisque $\rho(\alpha) \leq \|\alpha\|$.
2. La méthode de Jacobi converge si l'une des conditions suivantes est vérifiée :

$$(i) \quad \|\alpha\|_l = \max_{j=1,n} \sum_{i=1}^n |\alpha_{ij}| < 1$$

$$(ii) \quad \|\alpha\|_m = \max_{i=1,n} \sum_{j=1}^n |\alpha_{ij}| < 1$$

$$(iii) \quad \|\alpha\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |\alpha_{ij}|^2} < 1$$

3. Si $|\alpha_{ij}| < \frac{1}{n}$; $\forall i, j$ où n est la dimension du système, alors l'algorithme de Jacobi converge.

4.

$$\left. \begin{array}{l} \text{Si} \quad |\alpha_{ii}| > \sum_{i \neq j} |\alpha_{ij}|, \quad \forall i \\ \text{ou} \quad |\alpha_{jj}| > \sum_{i \neq j} |\alpha_{ij}|, \quad \forall j \end{array} \right\} \text{ alors le processus converge}$$

(Dans ce cas on dit que la matrice A est à diagonale dominante.)

Méthode de Gauss-Seidel

Introduction

Soit le système $AX = B$ où

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

Soient D, E et S les matrices définies par

$$D = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ & & a_{33} & & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} & \end{pmatrix}, \quad E = - \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & 0 & \dots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n,n-1} & 0 \end{pmatrix}$$

et

$$S = - \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ & 0 & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ & & & \dots & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & a_{n-1,n} \\ 0 & & & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

On a $A = D - E - S$ d'où : $AX = B \iff (D - E - S)X = B \iff DX = (E + S)X + B$.
Et de là $DX^{(k+1)} = (E + S)X^{(k)} + B$ ou encore

$$X^{(k+1)} = D^{-1}(E + S)X^{(k)} + D^{-1}B$$

qui n'est autre que la formule de Jacobi.

En effet :

$$\begin{aligned}
 D^{-1} &= \frac{1}{\prod_{i=1, \overline{n}} a_{ii}} \begin{pmatrix} \prod_{\substack{i=1, \overline{n} \\ i \neq 1}} a_{ii} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \prod_{\substack{i=1, \overline{n} \\ i \neq 2}} a_{ii} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & \prod_{\substack{i=1, \overline{n} \\ i \neq 3}} a_{ii} & \dots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & & & \dots & \prod_{\substack{i=1, \overline{n} \\ i \neq n}} a_{ii} \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \frac{1}{a_{11}} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{1}{a_{22}} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & \frac{1}{a_{33}} & \dots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & & & \dots & \frac{1}{a_{nn}} \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

et donc

$$D^{-1}(E + S) = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{a_{12}}{a_{11}} & \dots & -\frac{a_{1n}}{a_{11}} \\ -\frac{a_{21}}{a_{22}} & 0 & -\frac{a_{32}}{a_{22}} & \dots & -\frac{a_{2n}}{a_{22}} \\ \frac{a_{32}}{a_{33}} & -\frac{a_{32}}{a_{33}} & 0 & \dots & \frac{a_{22}}{a_{33}} \\ -\frac{a_{31}}{a_{33}} & -\frac{a_{32}}{a_{33}} & 0 & \dots & -\frac{a_{3n}}{a_{33}} \\ \frac{a_{33}}{a_{33}} & \frac{a_{33}}{a_{33}} & & & \frac{a_{33}}{a_{33}} \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ -\frac{a_{n1}}{a_{nn}} & -\frac{a_{n2}}{a_{nn}} & \dots & -\frac{a_{n, n-1}}{a_{nn}} & 0 \\ \frac{a_{nn}}{a_{nn}} & \frac{a_{nn}}{a_{nn}} & & & \frac{a_{nn}}{a_{nn}} \end{pmatrix}$$

Ainsi, on aboutit bel et bien à l'algorithme de Jacobi.

Algorithm 2.2.28 (Gauss-Seidel)

Une autre décomposition de A (autre que celle évoquée dans l'introduction ci-dessus) permet d'aboutir à la méthode de Seidel, appelée encore méthode de Gauss-Seidel.

On a $AX = B \iff (D - E - S)X = B \iff (D - E)X = SX + B$.

D'où $(D - E)X^{(k+1)} = SX^{(k)} + B$ ou encore

$$X^{(k+1)} = (D - E)^{-1}SX^{(k)} + (D - E)^{-1}B \quad (\text{Formule de Gauss-Seidel})$$

et en développant la formule récursive ci-dessus on aboutit à

Algorithme de Gauss-Seidel

$$\begin{cases} X^{(0)} \text{ donné} \\ x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left[b_i - \sum_{j < i} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j > i} a_{ij} x_j^{(k)} \right] \quad i = \overline{1, n} \end{cases}$$

2.2.5 Comparaison entre les méthodes :

1. Les méthodes itératives sont principalement utilisées pour des matrices de tailles et largement creuses. Les calculs croissent dans ce cas linéairement avec n.

Pour toute méthode itérative, il convient de s'assurer que la convergence est suffisamment rapide pour que le temps de calcul ne soit pas consommé sans que la recherche d'une solution ne soit réellement effectuée.

Cette comparaison des différentes méthodes itératives met en évidence que l'algorithme de Gauss-Seidel apporte une amélioration par rapport à celui de Jacobi, en permettant l'utilisation des nouvelles valeurs des variables déjà calculées lors d'une itération.

2. La méthode de Gauss-Seidel présente l'avantage suivant par rapport à celle de Jacobi. On n'est pas obligé de connaître toutes les composantes de $X^{(k)}$ pour pouvoir calculer $X^{(k+1)}$. La méthode de Jacobi nécessite le stockage des 2 vecteurs $X^{(k)}$ et $X^{(k+1)}$. par contre la méthode de Gauss-Seidel ne nécessite qu'un seul vecteur $(X_1^{(k+1)}, \dots, X_{i-1}^{(k+1)}, X_{i+1}^{(k+1)}, \dots, X_n^{(k)})$.

3. Pour pouvoir appliquer la méthode de Gauss-Seidel il faut (comme pour la méthode de Jacobi) que : $\forall i, a_{ii} \neq 0$.

4. tous les résultats de convergence pour la méthode de Jacobi restent valables pour la méthode de Gauss-Seidel.

5. Les méthodes itératives contrastent avec les méthodes directes qui résolvent le problème en une seule étape (par exemple la solution d'un système linéaire $AX=B$ obtenue en calculant la matrice inverse de A).

(a) celles-ci sont inapplicables, coûteuses ou simplement inconnues ;

(b) le problème est mal conditionné ou comprend un grand nombre de variables, car les solutions successives limitent la propagation des erreurs.

Par contre, la question de la vitesse de convergence (ou encore d'une éventuelle divergence) reste cruciale : c'est l'objet d'un vaste champ d'investigations de l'analyse numérique.

6. La méthode de Jacobi converge et la méthode de Gauss-Seidel diverge.
7. Méthode de Cholesky pour matrices symétriques et définie positive.

Chapitre 3

L'utilisation de l'outil informatique pour la résolution un système linéaire $AX=B$

3.1 Introduction sur MATLAB

MATLAB est un logiciel commercial de calcul interactif. Il permet de réaliser des simulations numériques basées sur des algorithmes d'analyse numérique. Il peut donc être utilisé pour la résolution approchée d'équations différentielles, d'équations aux dérivées partielles ou de systèmes linéaires, etc... La connaissance de ce logiciel est pour les mathématiciens et les informaticiens indispensable parce qu'il est de plus en plus utilisé dans l'industrie et les banques pour développer des prototypes de logiciels et tester de nouveaux algorithmes. Tous les ans entre vingt et trente pour cent des étudiants du DESS utilisent Matlab pendant leur stage.

Ensuite son apprentissage va passer par la mise en pratique des algorithmes d'analyse numérique étudiés plus théoriquement dans le reste du module.

3.2 Matrice et vecteur dans MATLAB

En mathématique, une matrice est constituée de n lignes et de m colonnes. Les coefficients de la matrice sont situés entre 2 parenthèses. Dans MATLAB, les parenthèses n'y figurent pas.

Une matrice carrée est une matrice dont le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes ($n = m$). Une matrice d'ordre 1 appelée *vecteur colonne*. Une matrice d'ordre 0 est un scalaire.

Dans le cas général, une matrice de n lignes et de m colonnes a pour coefficients a_{ij} , où $0 \leq i \leq n$ et $0 \leq j \leq m$. Si cette matrice est appelée A , ses coefficients sont les suivant :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2m} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

Si B est une autre matrice à p lignes et q colonnes, alors le produit $C = A * B$ n'est possible que si $m = p$. Dans ce cas, le coefficient c_{11} , par exemple de cette matrice C s'écrit :

$$c_{11} = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{12} + \dots + a_{1m}b_{1p} \quad (\text{avec } m = p).$$

Dans Matlab, la matrice produit C ($C = A * B$) a pour coefficients c_{ij} . Ces coefficients sont calculés en fonction de a_{ij} et de b_{ij} :

$$c_{ij} = \sum a_{ij}b_{ij}$$

Une matrice d'ordre zéro est une matrice à une ligne et une colonne : elle représente un scalaire.

Une matrice *nulle* est une matrice dont les coefficients sont tous nuls. En attribuant le nom 'A' à cette matrice, alors dans Matlab A s'écrit :

$$>> A = \text{zeros}(n, m)$$

où n et m sont respectivement le nombre de lignes et le nombre de colonnes.

La matrice *identité* est définie dans Matlab par la fonction : 'eye'

Exemple 3.2.1

$$0B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = IId$$

C'est une matrice carrée d'ordre 5. Dans Matlab, on peut l'écrire :

$$>> B = \text{eye}(5)$$

$$B =$$

```

1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1

```

Si B^t une matrice transposée de B , cette dernière s'écrit dans Matlab :

```
>> C = B' → ( l'apostrophe représente la transposée )
```

```

C =
1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1

```

Le déterminant d'une matrice carrée (C par exemple) est donné par :

```
>> det(C)
```

```
ans =
```

```
1
```

soit A une matrice non nulle. La matrice inverse A^{-1} de A (si elle existe) est telle que :

$$A * A^{-1} = Id$$

Dans Matlab, cette matrice inverse est donnée par :

$$A^{-1} = A^{(-1)} = inv(A) = pinv(A)$$

Exemple 3.2.2 :

```
>> A = [1 3 5;2 -1 0;5 4 3]
```

```

A =
1 3 5
2 -1 0
5 4 3

```

La matrice inverse de A est :

```
>> inv(A)
```

```

ans =
-0.0682  0.2500  0.1136
-0.1364 -0.5000  0.2273
 0.2955  0.2500 -0.1591

```

ou encore :

```
>> pinv(A)
```

```
ans =
```

-0.0682 0.2500 0.1136
 -0.1364 -0.5000 0.2273
 0.2955 0.2500 -0.1591

3.3 Equations et systèmes linéaires dans MATLAB

Considérons le systèmes suivants n équations à m inconnues :

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1m}x_m = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2m}x_m = b_2 \\ \dots = \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nm}x_m = b_m \end{cases} \implies AX = B$$

Dans ce système, on a $A = |a_{ij}|$ connue, $B = b_i$ connues et $X = x_i$ inconnues.

1. Si $n > m \implies$ système sur-déterminé,
2. Si $n = m \implies$ système de Cramer $\longrightarrow$ une solution unique (si $\det(A) \neq 0$),
3. Si $n < m \implies$ système sous-déterminé

La solution numérique du système (pour $n = m$) donne les inconnues x_i :

$$X = A/B$$

pour un vecteur colonne B donné ($B = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ par exemple), la solution par

Matlab est :

```
>> X = A^(-1) * B
X =
-0.5227
-1.0455
1.9318
```

Notation :

Soit la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & -1 & 0 \\ 5 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Dans Matlab, la matrice A peut être écrit sous les deux formes :

```
>> A = [1,3,5;2,-1,0;5,4,3];
```

ou bien :

```
>> A = [1 3 5;2 -1 0;5 4 3];
```

La séparation des lignes se fait par un point virgule et la séparation des colonnes se fait par un espace ou une virgule.

Exemple 3.3.1 :

```
>> A = [1 3 5;2 -1 0;5 4 3]
```

```
A =  
1 3 5  
2 -1 0  
5 4 3
```

3.4 Méthode directe (Méthode du pivot)

Soit à résoudre le système suivant de 3 équations à 3 inconnues par la méthode du pivot (dans Matlab) :

$$\begin{pmatrix} -0.04 & 0.04 & 0.12 \\ 0.56 & -1.56 & 0.32 \\ -0.24 & 1.24 & -0.28 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

déterminer x_1, x_2, x_3

1. On définit tout d'abord la matrice argument dans Matlab par :

```
>> A = [-0.04 0.04 0.12 3;0.56 -1.56 0.32 1;-0.24 1.24 -0.28 0]
```

2. On choisit la ligne 1 comme ligne pivot : $a(1, 1) = -0.04$,

on divise la ligne 1 par $a(1, 1) \rightarrow b(1, :) = a(1, :)/a(1, 1) \rightarrow$ nouvelle ligne,

on annule le 1^{er} terme de la ligne 2 et le 1^{er} terme de la ligne 3 :

$\dots \rightarrow b(2, :) = a(2, :) - b(1, :) * a(2, 1)$,

$\dots \rightarrow b(3, :) = a(3, :) - b(1, :) * a(3, 1)$.

On obtient après calculs :

```
b =  
1 -1 -3 -75  
0 -1 2 43  
0 1 -1 -18
```

3. On choisit la ligne 2 comme ligne pivot.

On divise cette ligne par $b(2, 2) = -1$, on obtient :

$\dots \rightarrow c(2, :) = b(2, :)/b(2, 2) \rightarrow$ nouvelle ligne = 0 1 -2 -43

on annule le terme $b(1, 2)$ de la ligne 1 et le terme $b(3, 2)$ de la ligne 3 :

$$\dots \longrightarrow c(1, :) = b(1, :) - c(2, :) * b(1, 2) \longrightarrow 1 \ 0 \ -5 \ 118 ,$$

$$\dots \longrightarrow c(3, :) = b(3, :) - c(2, :) * a(3, 2) \longrightarrow 0 \ 0 \ 1 \ 25 .$$

4. On choisit la ligne 3 comme ligne pivot $c(3, :)$.

On divise cette ligne par $c(3, 3) = 1$, on obtient :

$$\dots \longrightarrow d(3, :) = c(3, :) \longrightarrow \text{nouvelle ligne} = 0 \ 0 \ 1 \ 25$$

on annule dans la ligne 1 $c(1, 3)$ et dans la ligne 2 $c(2, 3)$:

$$\dots \longrightarrow d(1, :) = c(1, :) - d(3, :) * c(1, 3) \longrightarrow 1 \ 0 \ 0 \ 7 ,$$

$$\dots \longrightarrow d(2, :) = c(2, :) - d(2, :) * c(2, 3) \longrightarrow 0 \ 1 \ 0 \ 1 .$$

D'où la matrice d s'écrit :

$$d = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 25 \end{pmatrix}$$

et la solution est :

$$\begin{cases} x_1 = 7 \\ x_2 = 7 \\ x_3 = 25 \end{cases}$$

L'algorithme suivant (dans Matlab) permet de résoudre le système précédent :

`clear %effacer toutes les variables en mémoire dans Matlab`

`a = [-0.04 0.04 0.12 3; 0.56 -1 0.32 1; -0.24 1.24 -0.28 0]; a`

`x = [0 0 0]; %x est le vecteur colonne de composantes  $x_i$  qui est initialisé`

ici

`% 1er point pivot ligne 1 -calculs sur les lignes 2 et 3`

`b(1, :) = a(1, :) / a(1, 1);`

`b(2, :) = a(2, :) - b(1, :) * a(2, 1);`

1. `b(3, :) = a(3, :) - b(1, :) * a(3, 1); b`

`% 2ème pivot ligne 2 -calculs sur les lignes 1 et 3`

`c(2, :) = b(2, :) / b(2, 2);`

`c(1, :) = b(1, :) - c(2, :) * a(1, 2);`

1. `c(3, :) = b(3, :) - c(2, :) * a(3, 2); c`

`% 3ème pivot ligne 3 -calculs sur les lignes 1 et 2`

`d(3, :) = c(3, :) / b(3, 3);`

`d(1, :) = c(1, :) - d(3, :) * c(1, 3);`

1. `d(2, :) = c(2, :) - d(3, :) * c(2, 3); d`

%Solutions recherchées

$x(1) = d(1, 4);$

$x(2) = d(2, 4);$

$x(3) = d(3, 4); x$

après l'exécution de ce programma, on obtient :

$a =$

-0.0400 0.0400 0.1200 3.0000

0.5600 -1.5600 0.3200 1.0000

-0.2400 1.2400 -0.2800 0

$b =$

1.0000 -1.0000 -3.0000 -75.0000

0 -1.0000 2.0000 43.0000

0 1.0000 -1.0000 -18.0000

$c =$

1.0000 0 -5.0000 -118.0000

0 1.0000 -2.0000 -43.0000

0 0 1.0000 25.0000

$d =$

1.0000 0 0 7.0000

0 1.0000 0 7.0000

0 0 1.0000 25.0000

$x =$

7.0000

7.0000

25.0000

3.5 Méthodes itératives

3.5.1 Méthode de Gauss-Seidel

Résolution le système suivant par la méthode de Gauss-Seidel :

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 4 \\ 3x_1 + 2x_2 - 2x_3 = -2 \end{cases}$$

Écrire un algorithme (Matlab) permettant de calculer x_1, x_2 et x_3 par itérations.

Déterminer le nombre d'itérations nécessaires pour obtenir une erreur :

$$\theta(i) = |x_{n+1}(i) - x_n(i)| = 10^{10}$$

Solution 3.5.1 :

* **Méthode itérative générale :**

Appelons l'algorithme permettant de calculer la solution $\{x_i\}$ 'G-seid.m'

On se donne des valeurs arbitraires x_i^0 : par exemple $x_i^0 = 0$. Le système à résoudre est :

$$A * X = B; \text{ où } A = |a_{ij}|, X = x_i \text{ et } B = b_i$$

La matrice A et le vecteur colonne B sont connues, le vecteur colonne X reste inconnu. Ainsi, la méthode itérative générale consiste à écrire :

$$x(i) = \frac{b(i) - a(i,j).x(j)}{a(i,i)} \quad \text{pour } i \neq j \text{ et } a(i,i) \neq 0$$

En particulier, pour un système de 3 équations à inconnues, on a :

$$i = 1 \longrightarrow j = 2 \text{ et } 3 \implies x(1) = \frac{b(1) - a(1,2).x(2) - a(1,3).x(3)}{a(1,1)}$$

$$i = 2 \longrightarrow j = 1 \text{ et } 3 \implies x(2) = \frac{b(2) - a(2,1).x(1) - a(2,3).x(3)}{a(2,2)}$$

$$i = 3 \longrightarrow j = 1 \text{ et } 2 \implies x(3) = \frac{b(3) - a(3,1).x(1) - a(3,2).x(2)}{a(3,3)}$$

et ceci pour chaque itération.

Programme *itm.g.m* :

```
%*****
%Résolution d'un système linéaire *
%par la méthode itérative générale *
%*****

clear all;
clc;
fprintf('Méthode itérative générale\n');
n = 30000;
a = [1 1 1,2 -1 3,3 2 -2];
b = [1 4 -2];
x = zeros(1, 3);
w = 0.2; %facteur de relaxation : 0 < w < 1
epsilon = 1e - 10;
for k = 1 : n
    erreur = 0;
    for i = 1 : 3
        s = 0;
        xb = x(i);
        for j = 1 : 3
```

```

    if  $i \sim j$ 
         $s = s + a(i, j) * x(j)$ ;
    end
end
 $x(i) = w * (y(i) - s) / a(i, i) + (1, w) * x(i)$ ;
 $erreur = erreur + abs(x(i) - xb)$ ;
end
if ( $erreur / 3 < epsilon$ )
    fprintf('Itération no. : %d\t Erreur = %7.2e\n', k, erreur);
    break;
end
end
x

```

Conclusion Générale

Dans ce mémoire, nous avons étudié les systèmes d'équations linéaires, Nous avons commencé par des définitions et des notions qui servent à la compréhension de notre travail dans le premier chapitre. Ensuite nous avons présenté les différentes méthodes pour la résolution d'un système linéaire $AX=B$, nous avons donné une simple comparaison entre les différentes méthodes. Cette comparaison, nous a révélé qu'il y a une divergence entre ces méthodes en terme de temps et de précision, et qu'il y a des méthodes qui restent à moins efficacité quand le nombre des inconnues est très élevé.

Nous avons finalisé avec l'utilisation de l'outil informatique pour la résolution du système linéaire $AX=B$, où nous avons constaté, d'après les études qui ont été faites précédemment que le MATLAB est le meilleur environnement pour la programmation des méthodes de résolution du système linéaire $AX=B$.

Bibliographie

- [1] **CAIROLI** R.Cairolì, Algèbre Linéaire, Presse Polytechnique et Univeritaire Ramardes, Lausanne,2004.
- [2] **ETIENNE** Damien Etienne, Exercices corrigés d'Algèbre Linéaire, Tome 1, Bibliothèque Nationale, Paris : Avril 2006.
- [3] **EVA BAYER, PHILIPPE** Eva Bayer Fluckiger Philippe Chabloz, Algèbre linéaire, Ecole Polytechnique Bachelor 1 ère année 2008-2009.
- [4] **GOBLOT** Rémi Goblot, Algèbre linéaire, Mathématique à l'Université, Aout 2005.
- [5] **GOYIN** Paola GOTIN,Analyse Numérique, Université Sud Toulon-Var ISITV, 1^{er} année.
- [6] **LAKRIB** M.Lakrib, Cours d'Analyse Numérique, Universite Djallali Liabes Sidi Bel Abbés.
- [7] **POSTEL** Marie Postel, Introduction au logiciel MATLAB, Version révisée janvier 2005.